

Вита Омега-3 600, банка, 90 капс.

Состав: рыбий жир концентрированный; компоненты оболочки: желатин, глицерин (E422, агент влагоудерживающий), вода.

Клиническая ситуация	Рекомендации по применению
Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3	Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, не менее 2 месяцев, 2 раза в год
Для профилактики и в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний	Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, не менее 1 месяца
Для профилактики и в комплексном лечении аритмии и атеросклероза	Взрослым по 1 капсуле 1-3 раза в день во время еды, не менее 1 месяца или до достижения ремиссии
Для профилактики и в комплексном лечении диабета	1 капсула 1-2 раза в день во время еды до достижения стабилизации состояния
Для профилактики и в комплексном лечении заболеваний почек	1 капсула 1-2 раза в день во время еды до достижения стабилизации состояния
В профилактике и коррекции нарушений микробиоты кишечника	1 капсула 1-2 раза в день во время еды, 1-3 месяца или до достижения стабилизации состояния
Женщинам в период вынашивания и кормления для правильного формирования нервной системы ребенка	1 капсула 1-2 раза в день с едой весь период вынашивания и кормления грудью
В профилактике и комплексном лечении снижения когнитивных функций	1 капсула 1-3 раза в день с едой, не менее 3 месяцев или до достижения желаемого эффекта
Для поддержания белкового баланса, снижения потери и повышения набора скелетной мышечной массы	1 капсула 1-3 раза в день с едой, длительно
Для профилактики и в комплексном лечении воспалительных процессов, в том числе при депрессиях, обусловленных вялотекущим нейровоспалением	1 капсула 1-3 раза в день с едой, не менее 2-3-х месяцев или до достижения желаемого эффекта
В комплексных программах по профилактике раннего старения	Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, не менее 2 месяцев, 2 раза в год
В комплексных бьюти программах	Взрослым по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, не менее 1 месяца
В комплексной профилактике и реабилитации после перенесенных бактериальных и вирусных инфекций	Взрослым по 1 капсуле 1-2 раз в день во время еды, не менее 1 месяца

